

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

胃もたれ、食べすぎに効く 弱った胃を粘液のベールで整える胃ぐすり

第2類医薬品

セルベール®


特徴

健康な胃は、食物を消化する「胃酸」と胃酸などから胃を守る「胃粘液」の量のバランスが保たれています。しかし、胃もたれなどを起こす胃では、加齢、体調、食生活などの影響により「胃酸」と「胃粘液」のバランスが乱れ、胃酸や食物などによる刺激を受けやすく、また胃運動（蠕動運動）も低下しています。

セルベールは、胃を守る働きのある胃粘液の分泌を活発にし、さらに胃運動を高めることで、漫然と繰り返す“胃もたれ”や“胸やけ”などの不快な症状を改善します。弱った胃の働きを整えることで、気になる胃が楽になってきます。

※蠕動運動：食物を消化するための胃の運動

〈セルベールは、サッと溶けて飲みやすい細粒です。〉



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 高齢者
 - 肝臓病の人
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	腹部膨満感、はきけ、腹痛
精神神経系	頭痛
その他	皮下出血
 - 2週間位服用しても症状がよくなる場合
- まれに全身のだるさ、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）などがあらわれます。このような症状がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、下痢、口のかわき

効能・効果

胃もたれ、食べすぎ、飲みすぎ、胸やけ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、はきけ(むかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、胸つかえ

用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
小児(15歳未満)	服用しないこと	

成分と働き

成人1日量3包(3g)中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
テブレノン	112.5mg	胃の粘液量を増大させ、胃酸やアルコールなどの刺激から胃を守ります
ソウジュツ乾燥エキス (原生薬としてソウジュツ)	150mg (1.5g)	低下した胃運動を活発にし、胃もたれなどの自覚症状を改善します
コウボク乾燥エキス (原生薬としてコウボク)	83.4mg (1.0g)	

- (1)添加物として、タルク、乳糖、バニリン、ビタミンE、ヒドロキシプロピルセルロース、D-マンニトール、l-メントール、香料、ケイヒ、二酸化ケイ素、ハッカ油を含有します。
- (2)本剤は淡茶色の細粒剤です。有効成分に生薬を配合しているため、細粒の中に茶褐色の粒が混入している場合がありますが、効果には変わりありません。


ひとくちメモ

胃の粘液とテブレノン

胃では、肉や魚などのタンパク質を消化するために強力な胃酸が分泌されています。胃自身もタンパク質でできているのに消化されないのは、胃粘膜の表面が粘液のベールで守られているからです。テブレノンは、粘液の分泌を活発にして粘液量を増大させる働きがある成分です。加齢、体調、食生活の影響を受けて減少してしまった胃内の粘液量を増やし、胃酸などから胃を守ります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



包装

セルベール..... 12包, 27包

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎0120-161-454)
受付時間 平日9:00~18:00(土、日、祝日9:00~17:00)

ホームページ「胃のサイエンス」では胃の健康に関する情報をお届けしています。

www.i-no-science.com



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10