

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鼻炎用点鼻薬

第2類医薬品

# スカイナー®鼻炎スプレー

## 特徴

スカイナー鼻炎スプレーは、一定量のミクロの霧が鼻腔のすみずみまでゆきわたり、アレルギー性鼻炎や急性鼻炎による鼻づまりなどのつらい症状を改善します。

スカイナー鼻炎スプレーは、鼻粘膜に付着しやすい基剤の使用により液だれしにくくなっています。また、清涼化剤1-メントールの配合により、すっきりした使用感です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起こりやすくなる]

長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (5) 次の診断を受けた人

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- (2) 3日間位使用しても症状がよくなる場合

## 効能・効果

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず、くしゃみ、頭痛

## 用法・用量

次の量を鼻腔内に噴霧してください。

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人(15歳以上)	1～2度ずつ	6回まで
小児(7歳以上15歳未満)	噴霧	(3時間以上の間隔をあけること)
7歳未満		使用しないこと



(1) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。

(2) 小児(7歳以上15歳未満)に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3) 点鼻用にのみ使用してください。

## ご使用にあたって

- (1) キャップをとり、図1のように持ってください。初回使用時やしばらく間隔をおいてからご使用になるときは、薬液が噴霧するまで空吹きをしてください。  
注) 液の出が悪いからといって、噴霧口を針などで突くことはしないでください。
- (2) ノズルを鼻腔内に入れ、静かに息を吸いながら1～2度ずつ噴霧してください。
- (3) スプレー時には、容器を横にしないで図2のように鼻腔に押し込んでご使用ください。
- (4) ノズル部に鼻汁がついた場合は、清潔な布などでふき取ってください。



## 成分と働き

1 mL中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
塩酸テトラヒドロゾリン	1mg	鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻づまり、鼻みずを改善します
クロルフェニラミンマレイン酸塩	5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりをおさえます
リドカイン	5mg	鼻粘膜の痛み、かゆみをしずめます
グリチルリチン酸二カリウム	3mg	鼻粘膜の炎症をしずめます
ベンザルコニウム塩化物	0.2mg	感染を防ぎ鼻腔内を清潔にします

添加物として、エデト酸Na、マクロゴール、1-メントール、L-アルギニン、カルボキシビニルポリマー、等張化剤、pH調整剤を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



## 包装

スカイナー鼻炎スプレー ..... 14mL

### 本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」(フリーダイヤル ☎ 0120-161-454)  
受付時間 平日 9:00～18:00(土、日、祝日 9:00～17:00)

エーザイホームページでも商品の内容を紹介しています。

<http://www.eisai.co.jp>

製造販売元 東興薬品工業株式会社  
富山県中新川郡立山町辻20

発売元



エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10