

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

乗りもの酔い薬

第2類医薬品

# トラベルミン<sup>®</sup> チュロップぶどう味

## 特徴

トラベルミン チュロップぶどう味は、乗りもの酔いによるめまい・吐き気などの症状を予防・緩和し、旅行やお出かけを快適で楽しいものにするためのお薬です。お子様が服用しやすいドロップタイプなので、出発前のあわただしいときや気分が悪くなったときでも、その場ですぐに服用できます。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる】

#### 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）

#### 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります。）



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人：排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

## 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

## 用法・用量

乗物酔いの予防には、乗物に乗る30分前に、次の1回量をかむか、口中で溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	4時間以上の間隔をおいて2回まで
11歳以上15歳未満		
5歳以上11歳未満	1錠	服用しないこと
5歳未満		

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。1日の服用回数は2回までとしてください。

■小児(5歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。

### ご注意

- ・本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。
- ・服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れないでください。

## 成分と働き

1回量(11歳以上)2錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	1.33mg	自律神経に働き、乗りもの酔い症状を予防・緩和します
スコポラミン臭化水素酸塩水和物	0.166mg	乗りものによって起こる感覚の混乱を軽減します

添加物として、エタノール、クエン酸、プロピレングリコール、l-メントール、香料、アセスルファミンK、還元パラチノース、グリセリン脂肪酸エステル、銅クロロフィリンNaを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して保管し、なるべく早く服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



## 包装

トラベルミン チュロップぶどう味 ..... 6錠(2錠×3包)

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」(フリーダイヤル ☎ 0120-161-454)  
受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝日 9:00~17:00)

エーザイホームページでも商品の内容を紹介しています。

<http://www.eisai.co.jp>

製造販売元

高市製薬株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口10

発売元



エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10