

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

乗りもの酔い薬

第2類医薬品

トラベルミン[®]内服液

特徴

トラベルミン内服液は、うめ風味で飲みやすい液剤です。
車や船の中でも、すぐに飲めて、乗りもの酔いによるめまい・吐き気などの症状を予防、緩和します。



使用上の注意



してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる]

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります。)

3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人：排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって
医師又は薬剤師に相談してください
服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
その他	顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ

(裏面へつづく)

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
 □のかわき、便秘

効能・効果

乗りもの酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

用法・用量

乗りもの酔いの予防には、乗車船30分前に、次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
11歳以上	1 瓶 (20mL)	4 時間以上の間隔を置いて 3 回まで
11歳未満	服用しないこと	

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔を置いて服用してください。1日の服用回数は3回までとしてください。

■小児(11歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分と働き

1回量(11歳以上)1瓶(20mL)中に次の成分を含みます。

成 分	含 量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	30mg	自律神経に働き、乗りもの酔い症状を予防・緩和します
スコポラミン 臭化水素酸塩水和物	0.1mg	乗りものによって起こる感覚の混乱を軽減します
無水カフェイン	30mg	乗りものによって起こる感覚の混乱を予防します

添加物として、安息香酸Na、エタノール、エチルバニリン、クエン酸、クエン酸Na、グリセリン、D-ソルビトール、バニリン、パラベン、ブドウ糖果糖液糖、プロピレングリコール、トメントール、香料、還元麦芽糖水アメ、グリシン、ポビドン含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



包装

トラベルミン内服液 20mL × 2

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン室」(フリーダイヤル ☎ 0120-161-454)
受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝日 9:00~17:00)

エーザイホームページでも商品の内容を紹介しています。
<http://www.eisai.co.jp>