

ケイツーシロップの 飲ませ方

ケイツーシロップは、赤ちゃんのビタミンK不足による出血を予防するお薬です。
1回1包を飲ませてください。



保存方法

- ・直射日光や高温を避けて保存してください。
- ・小児の手の届かない所に保管してください。

監修: 東京女子医科大学 母子総合医療センター 楠田 聡

ご自宅での飲ませ方

<スプーンで飲ませる場合>

スプーンに原液シロップを少しずつ取り分けて、赤ちゃんの口に流し込んでください。

ほほの内側に垂らす様に流し込むとよいです。



<哺乳びんの乳首で飲ませる場合>

哺乳びんの乳首だけを赤ちゃんにくわえさせて、原液シロップを少しずつ流し込んでください。



<哺乳びんで飲ませる場合>

ミルクか湯冷まし、または母乳にシロップを混ぜて飲ませてください。

量は赤ちゃんが飲みきれ程度(10mL以下)に調整してください。

混ぜても良いもの

- ・湯冷まし
- ・母乳
- ・ミルク



10mL以下で
赤ちゃんが飲み
きれの量に調整
してください。



必ず哺乳びんやスプーンなどに移して飲ませてください。スティックのまま飲ませると、赤ちゃんのくちびるを傷つけたり、まちがって気道に入っておそれがあります。

飲ませ方の注意

- 使用直前に開封し、1回で使いきってください。
- 他のお薬と混ぜないでください。
- 目、鼻、耳に入らないように注意してください。


こんなときは・・・

- お薬を吐いたり、飲み残したとき
- お薬がこぼれてしまったとき


半分以下しか飲んでいないと思われるときは、次回の分を飲ませてください。次回の分をお持ちでない場合や、追加の使用で足りなくなった分に関しましては、主治医にご相談ください。



● 開封方法



① 開封前に、切り口部分に溜まっているお薬を指で軽く押して下の方へ移動させます。



② お薬が飛び散らないよう、なるべく上の方を持って、切り口から開封してください。

**ご不明な点は主治医または
看護師、薬剤師にご相談ください。**

医療機関名：



エーザイ株式会社

製品情報お問い合わせ先：お客様ホットライン
☎ 0120-419-497 9～18時(土、日、祝日 9～17時)

KTZ1001CKA
2011年10月作成