

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意の改訂のお知らせ

2026 年 7 月

プロトンポンプ阻害薬



製造販売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

平素より弊社製品をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。

このたび、7 月 14 日発出の課長通知に基づき標記製品の「使用上の注意」を下記のとおり改訂いたしました。本製品の販売にあたっては、下記内容をご参照いただき、本書を適正使用情報としてご活用いただきますようお願い申し上げます。

改訂内容ダイジェスト（詳細はお知らせ本文をご参照ください）

改訂項目	改訂理由等	備考
相談すること	重篤な症状として「低マグネシウム血症」を追記し、本追記に伴い、『関係部位：症状』の表から重複となる記載を削除しました。	通知による改訂

本改訂内容は OTC 医薬品 使用上の注意改訂情報（OTC 版 Drug Safety Update）第 16 版にも掲載される予定です（2026 年 8 月 4 日 PMDA ホームページ掲載予定）

- ★ 製品に関するお問い合わせ先：エーザイ株式会社 hhc ホットライン
フリーダイヤル 0120-161-454 9～18 時（土、日、祝日 9～17 時）
- ★ 製品情報は、エーザイホームページでご覧いただけます。
<https://www.eisai.jp>

本製品の最新添付文書は独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ
(<https://www.pmda.go.jp/>) からご覧ください。

〔改訂箇所及び改訂理由〕

相談することにおける『[関係部位：症状]』及び『重篤な症状』

＜改訂部分抜粋＞

下線部（ ）を追記、下線部（ ）を削除いたしました。

改訂後		改訂前	
相談すること		相談すること	
1. (略)		1. (略)	
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。		2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。	
[関係部位：症状]		[関係部位：症状]	
関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	(略)	皮膚	(略)
消化器	(略)	消化器	(略)
精神神経系	頭痛、めまい、ふらつき、眠気、四肢脱力、知覚鈍麻（知覚の低下）、握力低下、口のもつれ、失見当識（場所、時間、名前などが判らない）、せん妄（錯覚や幻覚を伴う軽い意識混濁）、昏睡（意識が完全に消失した状態）	精神神経系	頭痛、めまい、ふらつき、眠気、四肢脱力、知覚鈍麻（知覚の低下）、握力低下、口のもつれ、失見当識（場所、時間、名前などが判らない）、せん妄（錯覚や幻覚を伴う軽い意識混濁）、昏睡（意識が完全に消失した状態）、 <u>一時的にボーっとする、意識の低下、気を失う</u>
循環器	(略)	循環器	(略)
その他	貧血、目のかすみ・ちらつき、浮腫、倦怠感、発熱、脱毛症、しびれ感、関節痛、筋肉痛、女性化乳房	その他	貧血、目のかすみ・ちらつき、浮腫、倦怠感、発熱、脱毛症、しびれ感、 <u>顔や手足の筋肉がびくつく、手足の筋肉が硬直しガクガクとふるえる、</u> 関節痛、筋肉痛、女性化乳房
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。 その場合は直ちに医師の診療を受けてください。		まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。 その場合は直ちに医師の診療を受けてください。	
症状の名称	症 状	症状の名称	症 状
(略)	(略)	(略)	(略)
低マグネシウム血症	<u>吐き気、嘔吐、食欲不振、体がだるい、顔や手足の筋肉がびくつく、一時的にボーっとする、意識の低下、手足の筋肉が硬直しガクガクと震える、しびれ、めまい、動悸、気を失う等があらわれます。</u>	(新設)	(新設)

改訂理由

医療用医薬品のプロトンポンプ阻害剤の投与における「低マグネシウム血症」の副作用集積状況を踏まえ、医療用医薬品において使用上の注意改訂を行いました。

これに伴い、要指導医薬品についても医療用医薬品と同様、使用上の注意の改訂が適切と判断し、「相談すること」における「重篤な症状」として低マグネシウム血症を追記しました。

標記製品の添付文書切替について

弊社ホームページ及び医薬品医療機器総合機構に掲載している添付文書の更新は 2026 年 7 月に行います。流通品の切り替えは在庫状況等により、旧記載の製品が流通する時期がございますが、順次、改訂添付文書を封入した製品に切り替えてまいります。

CODE DI-J-1040

2026 年 7 月作成

(2701)