

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

본 제품은 일본국법에 근거하여 제조・판매되었습니다.
제품 및 문서는 일본 국외의 법규에 준하지 않습니다.
본 문서는 일본어의 제품 정보를 번역한 문서입니다. 사용 전에 반드시 읽어 보십시오.
또, 필요할 때 바로 꺼내 읽을 수 있도록 소중히 보관하십시오.

パリエットS

요지도 의약품



이 의약품은 약사로부터 설명을 들은 뒤, ‘사용상의 주의사항’을 잘 읽고 사용하십시오.

パリエット®S

Pariet S



양성자 펌프 억제제

효능・효과



속쓰림



위통



더부룩함

위통, 속쓰림, 더부룩함
(본제는 위산 분비를 억제하는 양성자 펌프 억제제를 포함하고 있습니다.)



용법 · 용량

다음과 같은 양을 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오. 2주 넘게 지속해서 복용하지 말 것.

연령	1회량	복용 횟수
성인(15세 이상)	1정	1일 1회
소아 (15세 미만)	복용하지 말 것	

용법 · 용량에 관한 주의사항

1. 용법 · 용량을 엄수하십시오.
2. 본제는 장에서 녹는 약이므로, 씹거나 부수지 않고 복용하십시오.
3. 1일 1회 같은 시간대에 복용하십시오.
4. 증상이 가라앉은 경우에는 복용하지 마십시오.

정제 꺼내는 법

오른쪽 그림과 같이 정제가 들어있는 시트의 불록한 부분을 손끝으로 강하게 누르고, 뒷면의 알루미늄 포일을 찢어 정제를 꺼내서 복용하십시오.(실수로 시트 그대로 삼키면 식도 점막에 꺾히는 등의 예상치 못한 사고로 이어질 수 있습니다.)



성분

성분과 작용

성인 1일 분량인 1정 안에는 아래와 같은 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	작용
라베프라졸 나트륨	10mg	위산 분비의 근원이 되는 양성자 펌프를 억제함으로써 위산 분비를 막습니다.

첨가물

산화마그네슘, 톨크, 하이드록시프로필 셀룰로스, D-만니톨, 에틸셀룰로스, 카르나우바 왁스, 카복시메틸셀룰로스칼슘, 글리세린 지방산 에스테르, 산화티타늄, 적색산화철, 스테아르산마그네슘, 하이드록시프로필 메틸셀룰로오스



주의 사항

▲ 사용상의 주의사항

하면 안 되는 사항

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉽습니다.

1. 다음과 같은 사람은 복용하지 마십시오.

- 본제 또는 본제의 성분에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람.
- 다음 의약품을 복용 중인 사람: 릴피비린 염산염

2. 본제를 복용하고 있는 동안에는 다음과 같은 의약품을 복용하지 마십시오.

다른 위장약

3. 수유 중인 사람은 본제를 복용하지 마십시오. 본제를 복용하는 경우에는 수유를 피하십시오.

4. 다른 양성자 펌프 억제제의 복용 기간을 합쳐 2주가 넘는 기간 이상 계속해서 복용하지 마십시오.(심각한 소화기 질환을 발견하지 못할 우려가 있으므로, 의사에게 진찰을 받으십시오.)

상담할 사항

1. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 임신부 또는 임신 가능성이 있는 사람
3. 고령자
4. 약 등에 의해 알레르기 증상이 나타난 적이 있는 사람
5. 다음과 같은 증상이 있는 사람: 원인 불명의 체중감소, 지속적인 위통 • 복통
6. 다음과 같은 진단을 받은 사람: 간장병, 위 • 십이지장 궤양

2. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우에는 부작용일 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고 이 설명서를 지참하여 의사 또는 약사와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진 • 발적, 가려움
소화기	변비, 설사, 복부팽만감, 메스꺼움 • 구토, 구내염, 복통, 쓴맛, 삼키기 어려움 • 속쓰림 • 구토 • 구강 백반증(칸디다 감염증 의심), 더부룩함, 갈증, 식욕부진, 설염
정신신경계	두통, 현기증, 어지러움, 졸음, 팔다리 힘 빠짐, 지각둔마(지각 저하), 약력 저하, 혀 꼬임, 지남력 상실(장소, 시간, 이름 등을 모름), 섬망(착각이나 환각을 동반하는 가벼운 의식 혼탁), 혼수상태(의식을 완전히 소실한 상태), 일시적으로 멍해짐, 의식 저하, 실신
순환기	혈압상승, 두근거림
기타	빈혈, 눈의 침침함 • 어긋거림, 부종, 권태감, 발열, 탈모증, 저림감, 얼굴이나 손발 근육이 쭈뼛거림, 손발 근육이 경직되어 바들바들 떨림, 관절통, 근육통, 여성형 유방

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 나타날 수 있습니다. 그럴 때는 즉시 의사에게 진찰을 받으십시오.

증상 명칭	증상
쇼크(아나필락시스)	복용 직후 피부의 가려움, 두드러기, 흰 목소리, 재채기, 목의 가려움, 숨 막힘, 두근거림, 의식 혼탁 등이 나타납니다.

피부점막안 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 중독성 표피 괴사 용해증	고열, 충혈, 눈곱, 입술 짓무름, 목의 통증, 피부의 광범위한 발진·발적 등이 지속되거나 급격히 악화됩니다.
간기능 장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자위가 노래짐), 갈색뇨, 전신 나른함, 식욕부진 등이 나타납니다.
신장 장애	발열, 발진, 소변량 감소, 전신 부종, 전신 나른함, 관절통(마디마디가 아픔), 설사 등이 나타납니다.
간질성 폐질환	계단을 오르거나 조금만 무리해도 숨이 참·숨쉬기 어려워짐, 마른기침, 발열 등이 보이고, 이러한 증상들이 갑자기 나타나거나 지속됩니다.
횡문근융해증	손발·어깨·허리 등의 근육이 아픔, 손발이 저림, 힘이 들어가지 않음, 굳어짐, 전신이 나른함, 적갈색뇨 등이 나타납니다.
혈액 장애	목의 통증, 발열, 전신 나른함, 현기증, 숨이 참, 얼굴이나 눈꺼풀 안이 하얘짐, 눈 흰자위가 노래짐, 피부가 노래짐, 소변 색이 진해짐, 쉽게 피가 남(잇몸 출혈, 코피 등), 시퍼런 멍이 생김(눌러도 색이 사라지지 않음) 등이 나타납니다.
저나트륨혈증	경련, 의식 저하, 두통, 메스꺼움, 구토 등이 나타납니다.
시력 장애	글자나 형태를 알아보기 힘들, 시야 이상 등이 나타납니다.
착란 상태	주의력이 산만해짐, 질문에 틀린 답을 함, 행동이 정돈되지 않음 등이 나타납니다.

3. 3일간 복용해도 증상이 개선되지 않을 경우에는 복용을 중지하고 이 설명서를 지참하여 의사 또는 약사와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의사항

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 품질이 저하될 수 있습니다.)
4. 내부 포장재(알루미늄 포장재) 안에 방습제가 들어있습니다. 복용하지 마십시오.
5. 사용기한이 지난 제품은 복용하지 마십시오.

6. 사용기한 안이라고 해도, 내부 포장재(알루미늄 포장재)를 개봉한 후에는 품질 유지를 위해 6개월 안에 복용하십시오.
상자를 개봉하는 곳의 ‘개봉 연월일’란에 개봉일을 기재하십시오.



포장 · 가격

포장	희망 소매가격
6정	세금 포함:1,628엔 (세금 별도:1,480엔)
12정	세금 포함:2,178엔 (세금 별도:1,980엔)