

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。

製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。

本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。

また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

由于本产品是根据日本国家法律所制造销售的产品，因此产品和文件内容不一定会遵守日本国以外的法律法规。

本文件是将日文的产品信息翻译成中文以供您参考，使用前请务必阅读。

同时，应进行妥善保管，以方便在必要时随时取阅。

パリエットS

需要指导的医药品



使用本医药品时，请先听取药剂师的指示，并仔细阅读“使用注意事项”。

パリエット®S

Pariet S



质子泵抑制剤

效能/效果

胃痛、胃热烧心、胃胀
(本制剂含有抑制胃酸分泌的质子泵抑制剂)

推荐使用场景



胃热烧心



胃痛



胃胀

用法/用量

请用水或热水服用下述量。请勿连续服用超过2周。

年龄	1次的量	服用次数
成人（15岁以上）	1片	1日1次
儿童（未满15岁）	请勿服用	

有关用法/用量的注意事项

1. 请严格遵守用法/用量。
2. 本制剂是肠道溶解的药，请不要咀嚼或粉碎服用。
3. 每日请在同一时间段服用1日1次。
4. 如果症状痊愈，请停止服用。

片剂的取出方法

如右图所示，用指尖用力按压装有药片的薄片的凸部，将背面的铝箔压破，取出药片后服用。（如果误将薄片吞下，可能会导致食道粘膜被刺破等意外事故。）



成分

成分和作用

成人每日1片中含有以下成分。

成分	含量	作用
雷贝拉唑钠	10mg	通过抑制胃酸分泌的源头质子泵来抑制胃酸分泌。

添加剂

氧化镁、滑石粉、羟丙基纤维素、D-甘露醇、乙基纤维素、巴西棕榈蜡、羧甲基纤维素钙、脂肪酸甘油酯、氧化钛、三氧化二铁、硬脂酸镁、羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯



注意事项

⚠ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前病情恶化，或容易出现副作用及事故

1. 下述人群请不要服用。

- 1. 因本制剂或本制剂成分出现过过敏症状的人群
- 2. 服用以下医药品的人群：盐酸利匹韦林

2. 在服用本药剂期间，请不要服用下述医药品。

其他肠胃药

3. 处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时请不要进行哺乳。

4. 包括使用其他质子泵抑制剂, 请勿连续服用此药超过2周。（严重的消化系统疾病可能会被忽视，请接受医生的诊察。）

咨询事项

1. 以下人群在服用前应咨询医师或药剂师。

- 1. 正在接受医师治疗的人群
- 2. 孕妇或疑似怀孕的人群
- 3. 老年人
- 4. 因药物等出现过过敏症状的人群
- 5. 拥有以下症状的人群：原因不明的体重减少、持续性的胃痛、腹痛
- 6. 接受以下诊断的人群:肝脏病、胃及十二指肠溃疡

2. 服用后若出现下述症状，则可能存在副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
消化系统	便秘、腹泻、腹部胀满感、恶心/呕吐、口腔溃疡、腹痛、苦味、吞咽困难/烧心/呕吐/口腔白斑（怀疑有念珠菌感染）、胃胀、口渴、食欲不振、舌炎
精神神经系统	头痛、头晕、发晕、嗜睡、四肢乏力、感觉迟钝（感觉力减弱）、握力下降、口齿不清、定向障碍（不知道地点、时间、名字等）、谵妄（伴有错觉和幻觉的轻度意识不清）、昏迷（意识完全消失的状态）
循环系统	血压上升、心悸
其他	贫血、视线模糊/眼花、浮肿、倦怠感、发烧、脱发症、麻木感、关节痛、肌肉痛、男子女性型乳房

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
休克（过敏性）	服用后立即出现皮肤发痒、荨麻疹、声音沙哑、打喷嚏、喉咙发痒、气闷、心悸、意识不清等症状。
皮肤粘膜眼综合症（史提芬强生症候群）、中毒性表皮坏死松解症	高烧、眼睛充血、眼眵、嘴唇糜烂、咽喉疼痛、皮肤大范围皮疹/发红等症状持续或急剧恶化。
肝功能障碍	出现发烧、发痒、皮疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。
肾损伤	出现发烧、皮疹、尿量减少、全身浮肿、全身无力、关节痛（各关节疼痛）、腹泻等症状。
间质性肺炎	上楼或因劳累而出现气短/气闷、空咳嗽、发烧，并且突然出现或长时间持续。
横纹肌溶解症	出现手脚/肩/腰等肌肉疼痛、手脚发麻、使不上力、僵硬、全身无力、红褐色尿等症状。
血液疾病	出现咽喉疼痛、发烧、全身无力、头晕、气短、脸和眼睑的内侧变白、眼白发黄、皮肤发黄、尿的颜色变深、容易出血（牙龈出血、鼻血等）、淤青（即使按压颜色也不会消失）等症状。
低钠血症	出现痉挛、意识模糊、头痛、恶心、呕吐等症状。
视力障碍	出现难以看清文字和形状、视野异常等症状。
错乱状态	出现注意力不集中、回答问题不正确、以及行动无条理等症状。
低镁血症	出现恶心、呕吐、食欲不振、身体无力、脸和手脚的肌肉抽搐、一时发呆、意识模糊、手脚肌肉变得僵硬颤抖、麻木、头晕、心悸、失去意识等症状。

3. 若服用3天症状仍无改善则应中止使用，并携带本说明书咨询医师或药剂师。

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，潮气小的阴凉场所。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。

- 3. 请不要移至其他容器中（会导致误用或变质）。
- 4. 内袋（铝袋）内装有干燥剂。请不要服用。
- 5. 请勿使用超过使用期限的产品。
- 6. 即使在使用期限内，开封内袋（铝袋）后，请在6个月内使用以保持品质。请在箱子开封口的“开封年月日”栏中写上开封日期。



包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:1,628日元（不含税:1,480日元）
12片	含税:2,178日元（不含税:1,980日元）