

本製品は日本国法に基づき製造販売されたものです。
製品および文書は日本国外の法規に準じているわけではありません。
本文書は、日本語の製品情報を翻訳した文書です。使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。
由於本產品是根據日本國家法律所製造銷售的產品，因此產品和文件內容不一定會遵守日本國以外的法律規定。
本文件是將日文的產品資訊譯成中文以供您參考，請務必在使用時閱讀。
請妥善保管以便在日後需要時隨時查閱。

パリエットS

要指導醫藥品

使用本產品前，請務必聽取藥劑師的說明，並詳閱「使用上的注意事項」。

パリエット®S

質子幫浦抑制劑

功效/效果



胸口灼熱



胃痛



腹脹

胃痛、胸口灼熱、脹氣
(本藥含有抑制胃酸分泌的質子幫浦抑制劑)

用法/用量

請將下列的量用水或熱水服用。請勿連續服用超過兩週。

年齡	1次的用量	服用次數
成人（15歲以上）	1錠	1天1次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	

有關用法/用量的注意事項

- 請嚴格遵守用法/用量。
- 本藥劑是腸溶藥物，請直接服用，請勿咀嚼或弄碎。
- 請1天1次於同一時間段服用。
- 若症狀已經緩解，請停止服用。

錠劑的取出方法

請如右圖所示，用指尖用力按壓錠劑所在包裝的凸起部分，撕破背面的鋁箔，取出錠劑服用。（如果不小心吞下整個錠劑包裝，可能會刺傷食道黏膜，造成意外事故。）

成分

成分與作用

成人1天分量1錠中含有下列成分。

成分	含量	作用
蘭索拉唑鈉	10 mg	通過抑制胃酸分泌的源頭－質子幫浦，來減少胃酸分泌。

添加物

氧化鎂、滑石粉、羟丙基纖維素、D-甘露醇、乙基纖維素、巴西棕櫚蠟、卡美羅素鈣、甘油脂肪酸酯、二氧化鈦、三氧化二鐵、硬脂酸鎂、羟丙基甲基纖維素酞酸鹽

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用。

- 下列人士請勿服用。
 - 曾對本藥劑或本藥劑成份有過敏反應的人。
 - 正服用下列醫藥品的人：鹽酸利匹韋林
- 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品。

其他的腸胃藥
- 哺乳中的人應避免服用本藥劑，或在服用本藥劑期間停止哺乳。
- 其他質子幫浦抑制劑的使用期間合計不得超過兩週。（可能會忽略嚴重的消化系統疾病，因此請諮詢醫師。）

諮詢事項

- 下列人士於服用前，請諮詢醫師或藥劑師。
 - 正在接受醫師治療的人
 - 孕婦或可能懷孕的人
 - 年長者
 - 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
 - 有下列症狀的人：原因不明的體重減少、持續的胃痛/腹痛
 - 接受過下列診斷的人：肝病、胃/十二指腸潰瘍
- 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師或藥劑師。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
消化系統	便秘、腹瀉、腹部膨脹感、噁心/嘔吐、口腔炎、腹痛、苦味、吞嚥困難/胸口灼熱/嘔吐/口腔白斑（可能為念珠菌感染）、胃脹、口乾、食慾不振、舌炎
精神神經系統	頭痛、頭暈、步態不穩、嗜睡、四肢無力、感覺遲鈍（感覺減退）、握力下降、口齒不清、定向障礙（無法辨識地點、時間、姓名等）、譫妄（伴隨錯覺或幻覺的輕度意識混亂）、昏迷（完全喪失意識）、短暫恍惚、意識不清、昏厥
循環系統	血壓上升、心悸
其他	貧血、視力模糊/眼花、水腫、疲勞感、發燒、脫髮、麻木感、臉部或四肢肌肉抽搐、四肢肌肉僵硬並顫抖、關節痛、肌肉痛、男性女乳症

在極少數的情況下，會出現以下嚴重症狀。若發生此類情況，請立即接受醫師的診治。

症狀名稱	症狀
休克（過敏性反應）	服用後立即出現皮膚癢、蕁麻疹、聲音沙啞、打噴嚏、喉嚨癢、呼吸困難、心悸、意識混亂等症狀。
皮膚粘膜眼症候群(史蒂芬強森症候群)、毒性表皮壞死溶解症	持續出現高燒、眼睛充血、眼屎、嘴唇潰爛、喉嚨痛、皮膚廣泛的發疹/發紅等症狀，或症狀急劇惡化
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚或眼白變黃）、褐色尿、全身乏力、食慾不振等症狀。
腎功能障礙	出現發燒、發疹、尿量減少、全身水腫、全身乏力、關節痛（關節疼痛）、腹瀉等症狀。
間質性肺炎	上樓梯或稍微勉強一下就會感到氣喘、呼吸困難，並伴隨乾咳、發燒等症狀，這些症狀可能會突然出現或持續。
橫紋肌溶解症	出現手腳/肩膀/腰部等肌肉疼痛，手腳麻木，無力，僵硬，全身乏力，紅褐色尿液等症狀。
血液循環障礙	出現喉嚨痛、發燒、全身乏力、頭暈、氣喘、臉部或眼瞼內側變白、眼白變黃、皮膚變黃、尿液顏色加深、容易出血（如牙齦出血、鼻血等）、瘀傷（按壓後顏色不會消失）等症狀。
低鈉血症	出現抽搐、意識不清、頭痛、噁心、嘔吐等症狀。
視力障礙	出現文字或形狀難以看清、視野異常等症狀。
精神錯亂狀態	出現注意力不集中、回答問題時作出錯誤回答、行為異常等症狀。

- 若服用3天後症狀仍沒改善，請停止服用並攜帶此說明書諮詢醫師或藥劑師。

保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。（可能導致誤用或變質。）
- 內袋（鋁箔袋）中含有乾燥劑，請勿服用。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。
- 即使在使用期限內，開封後的內袋（鋁箔袋）也應在6個月內使用，以保持品質。請在盒子開封口的「開封年月日」欄填寫開封日期。

包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅:1,628日圓（不含稅:1,480日圓）
12錠	含稅:2,178日圓（不含稅:1,980日圓）