# サクロン（顆粒）

第二类医药品

サクロン®

Saclon Granule

**让胃舒爽的绿色胃药。用于想吐、胃热烧心、饮酒过量**

胃部想吐、胃热烧心的症状可能是由于胃酸分泌过多所引起的。
另外，因过量饮酒而造成酒精对胃粘膜本身的刺激也是引起的原因之一。

サクロン可以减弱（中和）过量的胃酸作用，抑制其分泌，通过由叶绿素制作成的绿色成分可以修复和保护胃粘膜的损伤。

适用会出现胃部想吐、有锐痛症状的人士，或者早上刷牙时会出现恶心想吐的人士。轻松服下サクロン，还您一个舒爽的胃！

## 效能或效果

胃胀　胃热烧心　胃痛　宿醉

胃热烧心、饮酒过量、胃痛、胃酸过多、胃胀、胃部不适感、胃部胀满感、胃重、胸闷、打嗝、恶心（想吐、反胃、宿醉/醉酒想吐、作呕、恶心）、呕吐

## 用法及用量

请在饭间及睡前空腹时用水或温水服用下述量。

| 年龄 | 1次剂量 | 服用次数 |
| --- | --- | --- |
| 成人（15岁以上） | 1包 | 1天3次 |
| 8岁以上未满15岁 | 1/2包 | 1天3次 |
| 未满8岁 | 请勿服用 | - |

※饭间是指进餐后2个小时左右，胃内几乎没有食物时。

## 用法及用量相关注意事项

儿童（8岁以上未满15岁）请在监护人指导监督下服用。

# 成分

## 成分及作用

成人1天的量3包（3.84克）中含有下述成分。

| 成分 | 含量 | 药理作用 |
| --- | --- | --- |
| 叶绿素铜钾 | 120毫克 | 修复及保护损伤的胃粘膜。 |
| 无水磷酸氢钙 | 1,020毫克 | 直接中和分泌过量的胃酸。 |
| 沉淀碳酸钙 | 1,020毫克 | 直接中和分泌过量的胃酸。 |
| 氢氧化镁 | 960毫克 | 直接中和分泌过量的胃酸。 |
| 莨菪提取物 | 30毫克 | 抑制胃酸分泌，止痛。 |

## 添加剂

玉米淀粉、羟基丙基纤维素、l-薄荷醇、香料、氯化钾、肉桂、硬脂酸镁、聚维酮

## 成分相关注意事项

1. **服用后，粪便可能会变成绿色，这是叶绿素铜钾（绿色）被排泄引起的着色，请不必担心。**

2. **サクロン中未使用含铝的成分。**

# 注意事项

## ⚠ 使用注意事项

### 禁止事项

（若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用）

1. **在服用本药剂期间，请不要服用下述医药品。**

   胃肠镇痛镇痉药

2. **处于哺乳期时不要服用本药剂，或在服用本药剂时不要进行哺乳。**
   **（药剂可能会进入到母乳中，使婴儿的脉搏加快。）**

### 咨询事项

1. **以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。**

   1. 正在接受医师治疗的人
   2. 孕妇或疑似怀孕的人
   3. 老年人
   4. 因药物等出现过过敏症状的人
   5. 有以下症状的人
      排尿困难
   6. 接受过以下诊断的人
      肾病、心脏病、青光眼、甲状腺功能障碍

2. **服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。**

| 相关部位 | 症状 |
| --- | --- |
| 皮肤 | 皮疹/发红、发痒 |

3. **服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。**

   口腔干燥、便秘、腹泻

4. **若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。**

## 其他注意事项

可能导致难以产生母乳。

## 保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）
4. 如需服用1包分服后剩余药物时，请将袋口折叠进行保管，当超过2天后请勿服用。
5. 请勿使用超过使用期限的产品。

# 包装及价格

| 包装 | 建议零售价 |
| --- | --- |
| 10包 | 含税：1,078日元（不含税：980日元） |
| 20包 | 含税：2,046日元（不含税：1,860日元） |
| 32包 | 含税：3,113日元（不含税：2,830日元） |