

Saclon(과립)

제2류의약품



サクロン®

Saclon Granule

속이 시원해지는 녹색 위약. 메스꺼림, 속쓰림, 과음에.

메스꺼림이나 속쓰림은 위산이 과다 분비되어 생길 수 있습니다.

또한, 과음 시에 알코올이 위점막 자체를 직접 자극하는 것도 원인이 됩니다.

Saclon은 과다 분비된 위산의 작용을 감소(중화)시켜, 분비를 억제하여, 손상된 위점막을 염록소에서 만들어진 녹색 성분으로 수복하고 보호합니다.

속이 메스꺼리거나 찌르는 듯한 통증이 있는 분, 아침에 양치질할 때 욱 하고 구역질이 나는 분께. Saclon은 복용하면 시원하게 효과를 볼 수 있습니다.



효능 · 효과



더부룩함



속쓰림



위통



속취

속쓰림, 과음, 위통, 위산과다, 더부룩함, 위부불쾌감, 위부팽만감, 위가 무겁게 느껴짐, 답답함, 트림, 메스꺼움(메스꺼움, 속 울렁거림, 속취·술병에 인한 울렁거림, 느긋거림, 구역감), 구토



용법 · 용량

다음의 양을 식간 및 취침 전 공복 시에 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1포	1일 3회
8세 이상 15세 미만	1/2포	1일 3회
8세 미만	복용하지 말 것	-

*식간이란 식후 2시간 정도 경과하여 위 속 음식물이 거의 없어진 시점을 말합니다.

용법 · 용량 관련 주의사항

소아(8세 이상 15세 미만)에게 복용시킬 경우 보호자의 지도 감독하에 복용하게 하십시오.



성분

성분과 작용

성인 1일 복용량 3포(3.84g) 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
동클로로필린칼륨	120mg	손상된 위점막을 수복하고 보호합니다.
무수인산수소칼슘	1,020mg	과다 분비된 위산을 직접 중화합니다.
침강탄산칼슘	1,020mg	과다 분비된 위산을 직접 중화합니다.
수산화마그네슘	960mg	과다 분비된 위산을 직접 중화합니다.
스코폴리아엑스	30mg	위산 분비를 억제하여 통증을 멈추게 합니다.

첨가물

옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, L-멘톨, 향료, 염화칼륨, 계피, 스테아린산마그네슘, 포비돈

성분 관련 주의사항

- 복용 후, 대변이 녹색으로 변할 수 있으나 이는 동클로로필린칼륨(녹색)의 배설에 따른 착색이므로 걱정 안하셔도 됩니다.
- Saclon에는 알루미늄 함유 성분을 사용하지 않았습니다.



주의사항

⚠ 사용상의 주의

해서는 안 되는 사항

[지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉽습니다.]

1. 이 약을 복용하는 동안은 다음 의약품을 복용하지 마십시오.

위장진통진경제

2. 수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 이 약을 복용할 경우에는 수유를 피하십시오.

(모유로 이행하여 유아의 맥박이 빨라질 수 있습니다.)

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
3. 고령자
4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
5. 다음의 증상이 있는 사람
 배뇨곤란
6. 다음의 진단을 받은 사람
 신장병, 심장병, 녹내장, 갑상선기능장애

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
------	----

피부

발진 · 발적, 가려움

3. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 변비, 설사

4. 2주일 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

기타 주의

모유가 잘 나오지 않게 될 수 있습니다.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기 안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)
4. 1포를 분할하고 남은 약제를 복용할 경우, 개봉부분을 접어서 보관하며, 이틀이 지난 후에는 복용하지 마십시오.
5. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 및 가격

포장	권장소비자가격
10포	세금 포함:1,078엔 (세금 별도:980엔)
20포	세금 포함:2,046엔 (세금 별도:1,860엔)

32 포

세금 포함:3,113엔 (세금 별도:2,830엔)