

サクロンQ

第二类医药品



サクロン[®]Q

Saclon Q



阻断末梢神经传递。可对想吐、恶心、胃痛能迅速起效

サクロンQ是对因胃酸、酒精等刺激胃粘膜而引起的“想吐、恶心、胃痛”能快速起效的胃药。

因为是服用后能快速溶解的速溶制剂，所以能在胃中马上溶解，其成分（奥昔卡因）会直接作用于胃粘膜，快速改善不适症状。

感觉胃部疼痛等时可随时服用。

1天服用不超过3次，每次服用需间隔4小时以上

效能或效果



胃痛



宿醉

胃痛、腹痛、恶心（想吐、反胃、宿醉・醉酒想吐、作呕、恶心），呕吐、绞痛（腹绞痛、痉挛）、胃热烧心、胃酸过多、胃部不适、打嗝（暖气）



用法及用量

请用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	2片	1天不超过3次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-

每次服用请间隔4小时以上。

用法及用量相关注意事项

请不要咀嚼，立即吞下药剂。（本药剂为快速溶解的片剂，如果成分扩散在口腔内，口腔中会残留麻木感。）

如何取出药片

用指尖用力按压装有药片的泡罩包装的凸起部分，挤破背面的铝箔，取出药片并将其服用。（如果不慎将泡罩包装也一起吞入的话，会导致食道粘膜被刺伤等意外事故。）



成分

成分及作用

成人1次的量2片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
奥昔卡因	5毫克	直接作用于胃粘膜，阻断胃痛、恶心等的刺激。

添加剂

玉米淀粉、D-甘露醇、硬脂酸钙、纤维素



注意事项

⚠ 使用注意事项

禁止事项

(若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用)

1. 以下的人请勿服用。

1. 孕妇或疑似怀孕的人
2. 未满15岁的儿童

2. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。

其他胃肠药（含有莨菪提取物的制剂）、其他胃肠镇痛镇痉药

3. 请勿长期连续服用。

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

1. 正在接受医师治疗的人
2. 老年人
3. 因药物等出现过过敏症状的人

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
精神神经系统	头痛、嗜睡、头晕、无力

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

便秘

4. 若服用5~6次后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。



包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:748日元（不含税:680日元）
12片	含税:1,408日元（不含税:1,280日元）