

サクロンQ

제2류의약품



サクロン[®]Q

Saclon Q



말초신경에서 전달을 차단. 메스꺼움·메스꺼움·위통에 빠른 효과.

Saclon Q는 위산이나 알코올 등이 위점막을 자극하여 생긴 '메스꺼움·메스꺼움·위통'에 신속하게 효과를 발휘하는 위약입니다.

복용 후 빠르게 용해되는 속효성 제제이므로 위 안에서 금방 녹아 성분(옥세타자인)이 위점막에 직접 작용, 괴로운 증상을 신속하게 개선합니다.

위통이 있을 때 아무 때나 복용할 수 있습니다.

(1일 3회까지로 하며, 복용간격은 4시간 이상 두어야 합니다.)

효능·효과



위통 속취

위통, 복통, 메스꺼움(메스꺼움, 속 울렁거림, 속취·술병에 인한 울렁거림, 느긋거림, 구역감), 구토, 급경련통(복부 산통), 속쓰림, 위산과다, 위부불쾌감, 트림



용법 · 용량

다음의 양을 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	2정	1일 3회까지
소아(15세 미만)	복용하지 말 것	-

복용간격은 4시간 이상 두어 주십시오.

용법 · 용량 관련 주의사항

씹지 말고 바로 삼켜 주십시오.(빠르게 녹는 정제이므로 성분이 입안에 퍼지면 구내 마비감이 남게 됩니다.)

정제 꺼내는 법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 불록한 부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 끼히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)



성분

성분과 작용

성인 1회량 2정 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
옥세타자인	5mg	위점막에 직접 작용하여 위통, 메스꺼움 등의 자극을 차단합니다.

첨가물

옥수수전분, D-만니톨, 스테아린산칼슘, 셀룰로오스

주의사항

▲ 사용상의 주의

해서는 안 되는 사항

[지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용이 발생하기 쉽습니다.]

1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

- 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
- 15세 미만의 소아

2. 이 약을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 위장약(스코폴리아엑스를 함유하는 제제), 다른 위장진통진경제

3. 장기간 복용하지 마십시오.

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

- 의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 고령자

3. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진·발적, 가려움
정신신경계	두통, 졸음, 어지러움, 탈력감

3. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

변비

4. 5~6회 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의 주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기 안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)

4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 및 가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:748엔 (세금 별도:680엔)
12정	세금 포함:1,408엔 (세금 별도:1,280엔)