

サクロン錠

第二類醫藥品



サクロン[®]錠

Saclon Tablets

令胃部變得暢快的綠色胃藥。用於想吐、胸口灼熱及飲酒過量

胃部想吐及胸口灼熱可能是由於胃酸過多所致。此外，因飲酒過量而令酒精直接刺激胃部黏膜，亦是原因之一。

サクロン錠能減弱（中和）過多的胃酸作用，抑制其分泌，由葉綠素所製成的綠色成分能修復及保護受傷的胃黏膜。

適合胃部想吐及痛楚加劇等的人、或早上刷牙時會作嘔的人。立刻服用サクロン錠，輕鬆見效。

療效或效果



腹脹



胸口灼熱



胃痛



宿醉

胸口灼熱、飲酒過量、胃痛、胃酸過多、腹脹、胃部不適、胃部膨脹感、胃部沉重感、胸口悶氣、噯氣、噁心（想吐、反胃、宿醉或醉酒時想吐、作嘔、噁心）、嘔吐

用法及用量

請將下列的量於空腹時（於餐間或臨睡前），用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	4錠	1天3次
8歲以上未滿15歲	2錠	1天3次
未滿8歲	請勿服用	-

※餐間是指餐後超過約兩小時，胃中的食物已幾乎被消化完的時候。

用法及用量相關的注意事項

要給兒童（8歲以上未滿15歲）服用時，請在家長的指導監督下服用。



成分

成分與主要作用

成人1天的量12錠中含有下列成分。


成分	含量	主要作用
銅葉綠素鉀	120mg	修復及保護受傷的胃黏膜。
無水磷酸氫鈣	1,020mg	直接中和分泌過多的胃酸。
沉澱碳酸鈣	1,020mg	直接中和分泌過多的胃酸。
氫氧化鎂	960mg	直接中和分泌過多的胃酸。
東莨菪萃取物	30mg	抑制胃酸分泌，止痛。

添加劑

玉米澱粉、羥丙基纖維素、l-薄荷醇、香料、氯化鉀、肉桂、硬脂酸鎂、聚維酮

成分相關的注意事項

- 服用後，大便有可能會呈現綠色。這是由於銅葉綠素鈉被排泄時的染色。不用擔心。
- サクロン錠沒有使用含鋁的成分。



注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

[若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用]

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列醫藥品。

胃腸鎮痛鎮痙攣藥

2. 哺乳中的人請勿服用本藥劑，或在服用本藥劑時避免哺乳。
(藥劑可能進入到母乳中，使嬰兒的脈搏加快。)

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 有下列症狀的人
排尿困難
6. 接受過下列診斷的人
腎臟病、心臟病、青光眼、甲狀腺功能障礙

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、腹瀉

4. 若服用兩週左右後症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

其他注意事項

有可能令母乳分泌困難。

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）
4. 4錠分包裝的產品，請注意下列事項。
服用分包裝餘下的藥劑時，請將包裝袋口摺好，然後保管。超過兩日後請勿服用。
5. 96錠裝的產品，請注意下列事項。
 1. 容器內的填充物是為防止錠劑於運送途中破損。開封後請將此填充物取出丟棄。此外，並蓋緊容器然後保管。
 2. 即使在使用期限內，一旦打開容器瓶蓋後，請在大約6個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內填寫開封日期。
6. 請勿使用已超過使用期限的產品。



包裝及價格

包裝	建議零售價
40錠	含稅:1,078日圓（不含稅:980日圓）
96錠	含稅:2,134日圓（不含稅:1,940日圓）