

セルベール（細粒）

第二类医药品



セルベール®

Selbelle fine granules



用于胃胀、胃热烧心，通过胃粘液屏障来调整胃部衰弱的胃药

セルベール通过能够增加胃粘液的成分“替普瑞酮”和“生药”来保护衰弱的胃，使其恢复活力。

建议平时感觉胃部虚弱的人服用。

- 反复出现【胃胀】【胃热烧心】等胃部不适的人
- 有些劳累或是稍微加重了胃负担就感觉不舒服的人
- 因止疼药，感冒药引起胃部不适的人

セルベール通过增加【胃粘液】来保护胃粘膜不受胃酸等的刺激，并通过激活胃的运动来调整胃部虚弱的状态。

セルベール是可以快速溶解，易于服用的细颗粒。

保护并帮助胃恢复活力的【整胃®】作用使胃部感觉更轻松。

效能或效果



食欲不振



胃胀



进食过量·
饮酒过量



胃热烧心

胃胀、胃热烧心、进食过量、饮酒过量、胃部/腹部胀满感、食欲不振、恶心（想吐、作吐、恶心）、呕吐、胸闷

用法及用量

请在饭后用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1包	1天3次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-

成分

成分及作用

成人1天的量3包（3克）中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
替普瑞酮	112.5mg	增加胃粘液，保护胃不受胃酸、酒精等刺激。
苍术干燥提取物 (原生药即苍术)	150毫克 (1.5克)	激活减弱的胃运动。
厚朴干燥提取物 (原生药即厚朴)	83.4毫克 (1.0克)	激活减弱的胃运动。

添加剂

滑石粉、乳糖、香草醛、维生素E、羧丙基纤维素、D-甘露醇、L-薄荷醇、香料、肉桂、二氧化硅、薄荷油



注意事项

⚠ 使用注意事项

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

1. 正在接受医师治疗的人
2. 孕妇或疑似怀孕的人
3. 老年人
4. 因药物等出现过过敏症状的人
5. 接受过以下诊断的人
肝脏病

2. 服用后若出现下述症状，则可能存是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒
消化系统	腹部胀满感、恶心、腹痛
精神神经系统	头痛
其他	皮下出血

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
肝功能障碍	出现发烧、发痒、皮疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

便秘、腹泻、口腔干燥

4. 若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 本剂为浅棕色细颗粒剂。由于含有生药作为有效成分，因此细颗粒中可能会混有深棕色颗粒，但是不影响药效。
4. 请勿使用超过使用期限的产品。



包装及价格

包装	建议零售价
12包	含税：1,045日元（不含税：950日元）
27包	含税：2,178日元（不含税：1,980日元）