

セルベール（細粒）

第二类医药品



セルベール®

Selbelle fine granules



用于胃胀、胃热烧心，通过胃粘液屏障来调整胃部衰弱的胃药

セルベール通过能够增加胃粘液的成分“替普瑞酮”和“生药”来保护衰弱的胃，使其恢复活力。

建议平时感觉胃部虚弱的人服用。

- 反复出现【胃胀】【胃热烧心】等胃部不适的人
- 有些劳累或是稍微加重了胃负担就感觉不舒服的人
- 因止疼药，感冒药引起胃部不适的人

セルベール通过增加【胃粘液】来保护胃粘膜不受胃酸等的刺激，并通过激活胃的运动来调整胃部虚弱的状态。

セルベール是可以快速溶解，易于服用的细颗粒。

保护并帮助胃恢复活力的【整胃®】作用使胃部感觉更轻松。

效能或效果



食欲不振



胃胀



进食过量・
饮酒过量



胃热烧心

胃胀、胃热烧心、进食过量、饮酒过量、胃部/腹部胀满感、食欲不振、恶心（想吐、作吐、恶心）、呕吐、胸闷



用法及用量

请在饭后用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1包	1天3次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-



成分

成分及作用

成人1天的量3包（3克）中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
替普瑞酮	112.5mg	增加胃粘液，保护胃不受胃酸、酒精等刺激。
苍术干燥提取物 （原生药即苍术）	150毫克 （1.5克）	激活减弱的胃运动。
厚朴干燥提取物 （原生药即厚朴）	83.4毫克 （1.0克）	激活减弱的胃运动。

添加剂

滑石粉、乳糖、香草醛、维生素E、羧甲基纤维素、D-甘露醇、L-薄荷醇、香料、肉桂、二氧化硅、薄荷油



注意事项

▲ 使用注意事项

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 正在接受医师治疗的人
- 孕妇或疑似怀孕的人
- 老年人
- 因药物等出现过过敏症状的人
- 接受过以下诊断的人
肝脏病

2. 服用后若出现下述症状，则可能存是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒
消化系统	腹部胀满感、恶心、腹痛
精神神经系统	头痛
其他	皮下出血

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
肝功能障碍	出现发烧、发痒、皮疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

便秘、腹泻、口腔干燥

4. 若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

- 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。
- 请保管在儿童无法触及的地方。
- 本剂为浅棕色细颗粒剂。由于含有生药作为有效成分，因此细颗粒中可能会混有深棕色颗粒，但是不影响药效。
- 请勿使用超过使用期限的产品。



包装及价格

包装	建议零售价
12包	含税：1,045日元（不含税：950日元）
27包	含税：2,178日元（不含税：1,980日元）