

セルベール (細粒)

제2류의약품



セルベール®

Selbelle fine granules



더부룩함, 속쓰림에 약해진 위 기능을 점액막으로 개선해주는 위약

SELBELLE은 위점액을 늘리는 성분 ‘테프레논’과 ‘생약’이 약해진 위를 보호하여 건강하게 해줍니다.

평소부터 위 기능 저하를 느끼는 분께 추천합니다.

- ‘더부룩함’, ‘속쓰림’ 등 위의 증상을 만성적으로 반복하는 분
- 약간 무리를 하거나, 약간 위에 부담을 주는 것만으로 불편한 증상을 느끼는 분
- 진통제, 감기약 복용으로 위가 상한 적이 있는 분

SELBELLE은 위산 등의 자극으로부터 위의 점막을 보호하는 ‘위점액’을 늘리고, 위의 운동을 활발하게도 하여 약해진 위 기능을 개선해줍니다.

SELBELLE은 금방 녹아 복용하기 쉬운 세립입니다.

위를 보호하고 건강한 위로 회복시켜주는 ‘整胃(위 기능 개선)®’의 작용으로 위가 편해집니다.

효능 · 효과



식욕부진



더부룩함



과식 · 과음



속쓰림

더부룩함, 속쓰림, 과식, 과음, 위부 · 복부팽만감, 식욕부진, 메스꺼움(메슥거림, 느글거림, 구역감), 구토, 답답함

용법 · 용량

다음의 양을 식후에 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1포	1일 3회
소아(15세 미만)	복용하지 말 것	-

성분

성분과 작용

성인 1일 복용량 3포(3g) 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
테프레논	112.5mg	위점액을 늘려서, 위산 및 알코올로 인한 자극으로부터 위를 보호해줍니다.
창출 건조 추출물 (원생약으로서 창출)	150mg (1.5g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다.
후박 건조 추출물 (원생약으로서 후박)	83.4mg (1.0g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다.

첨가물

탱크, 유당, 바닐린, 비타민E, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨, L-멘톨, 향료, 계피, 이산화규소, 박하유



주의사항

▲ 사용상의 주의

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
3. 고령자
4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
5. 다음의 진단을 받은 사람
간장병

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	복부팽만감, 메스꺼움, 복통
정신신경계	두통
기타	피하출혈

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상명	증상
간기능장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자위가 노랗게 됨), 갈색뇨, 전신 나른함, 식욕부진 등이 나타납니다.

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

변비, 설사, 입마름

4. 2주일 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

보관 및 취급상의주의

- 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 본 제품은 연한 갈색의 세립제입니다. 유효성분으로 생약을 배합하고 있으므로, 세립 안에 다갈색의 입자가 섞여 있는 경우가 있지만, 효과는 다르지 않습니다.
- 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 및 가격

포장	권장소비자가격
12포	세금 포함:1,045엔 (세금 별도:950엔)
27포	세금 포함:2,178엔 (세금 별도:1,980엔)