

# セルベール (細粒)

제2류의약품



## セルベール®

Selbelle fine granules



더부룩함, 속쓰림에 약해진 위 기능을 점액막으로 개선해주는 위약

SELBELLE은 위점액을 늘리는 성분 '테프레논'과 '생약'이 약해진 위를 보호하여 건강하게 해줍니다.

평소부터 위 기능 저하를 느끼는 분께 추천합니다.

- '더부룩함', '속쓰림' 등 위의 증상을 만성적으로 반복하는 분
- 약간 무리를 하거나, 약간 위에 부담을 주는 것만으로 불편한 증상을 느끼는 분
- 진통제, 감기약 복용으로 위가 상한 적이 있는 분

SELBELLE은 위산 등의 자극으로부터 위의 점막을 보호하는 '위점액'을 늘리고, 위의 운동을 활발하게 도 하여 약해진 위 기능을 개선해줍니다.

SELBELLE은 금방 녹아 복용하기 쉬운 세립입니다.

위를 보호하고 건강한 위로 회복시켜주는 '整胃(위 기능 개선)®'의 작용으로 위가 편해집니다.

## 효능 · 효과



식욕부진



더부룩함



과식 · 과음



속쓰림

## 용법 · 용량

다음의 양을 식후에 찬물 또는 따뜻한 물과 함께 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
성인(15세 이상)	1포	1일 3회
소아(15세 미만)	복용하지 말 것	-

## 성분

### 성분과 작용

성인 1일 복용량 3포(3g) 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
테프레논	112.5mg	위점액을 늘려서, 위산 및 알코올로 인한 자극으로부터 위를 보호해줍니다.
창출 건조 추출물 (원생약으로서 창출)	150mg (1.5g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다.
후박 건조 추출물 (원생약으로서 후박)	83.4mg (1.0g)	약해진 위의 운동을 활발하게 해줍니다.

### 첨가물

말크, 유당, 바닐린, 비타민E, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨, L-멘톨, 향료, 계피, 이산화규소, 박하유

## 주의사항

### ▲ 사용상의 주의

## 상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
3. 고령자
4. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
5. 다음의 진단을 받은 사람  
간장병

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진, 발적, 가려움
소화기	복부팽만감, 메스꺼움, 복통
정신신경계	두통
기타	피하출혈

드물게 아래와 같은 심각한 증상이 일어날 수 있습니다. 그런 경우에는 즉시 의사의 진료를 받으십시오.

증상명	증상
간기능장애	발열, 가려움, 발진, 황달(피부 및 눈 흰자위가 노래짐), 갈색뇨, 전신 나른함, 식욕부진 등이 나타납니다.

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

변비, 설사, 입마름

4. 2주일 정도 복용해도 증상이 좋아지지 않는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

## 보관 및 취급상의주의

1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3. 본 제품은 연한 갈색의 세립제입니다. 유효성분으로 생약을 배합하고 있으므로, 세립 안에 다갈색의 입자가 섞여 있는 경우가 있지만, 효과는 다르지 않습니다.
4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



## 포장 및 가격

포장	권장소비자가격
12포	세금 포함:1,045엔 (세금 별도:950엔)
27포	세금 포함:2,178엔 (세금 별도:1,980엔)