

新セルベール整胃プレミアム アム<錠>

第二類醫藥品



新セルベール®整胃プレミアム<錠>

New Selbelle Premium Tablets



用於腹脹、進食過量，調整虛弱胃部的胃藥

守護胃部的胃黏液會隨著年齡的增長而減少，因此容易感到腹脹等。

新セルベール整胃プレミアム<錠>含有與醫療用途相同份量的增加胃黏液、守護胃部的成分「替普瑞酮」，以及激活胃部的「天然藥材」與「消化酵素」，守護變得虛弱的胃部，恢復胃部健康。

新セルベール整胃プレミアム<錠>是能夠支援人生100年時代飲食的胃藥。恢復本來的胃部健康，讓您與家人及友人一起享受美食佳餚的幸福時光。

推薦給最近感到胃部虛弱的人。

- 餐後感到腹脹的情況變多的人
- 吃了小量就感到進食過量的人
- 最近總是感到腹脹的人
- 胃部功能遲緩，感到食物殘留於胃部的人
- 變得不太能吃油膩食物的人

新セルベール整胃プレミアム<錠>有三重功效，改善腹脹等胃部虛弱症狀。

- 守護→增加附於胃黏膜表面的屏障「胃黏液」，守護胃部。
- 激活→激活胃部運動。
- 消化→分解脂肪，提高消化力。

新セルベール整胃プレミアム<錠>1次1錠就有效，容易服用。守護胃部，恢復胃部健康的『整胃』功效，讓胃部變得輕鬆。

療效或效果



食欲不振



腹脹



進食過量・
飲酒過量



胸口灼熱

腹脹、進食過量、食欲不振、胃部及腹部膨脹感、胸口灼熱、飲酒過量、噁心（想吐、作嘔、噁心）、嘔吐、胸悶

用法及用量

請於餐後將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1錠	1天3次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	-

成分

成分及主要作用

成人1天的量3錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
替普瑞酮	150 mg	增加胃黏液，保護胃部免受進食或胃酸的刺激。
乾燥蒼朮萃取物（蒼朮原料）	150 mg (1.5g)	激活減弱了的胃部運動。
乾燥厚朴萃取物（厚朴原料）	83.4 mg (1.0g)	激活減弱了的胃部運動。
解脂酶AP6	14.7 mg	幫助消化脂肪－引起腹脹的主要原因。

添加劑

滑石粉、維生素E、部分預膠化澱粉、赤藓糖醇、矽酸鈣、聚維酮



注意事項

▲ 使用上的注意事項

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 接受過下列診斷的人
肝臟病

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	腹部膨脹感、噁心、腹痛
精神神經系統	頭痛
其他	皮下出血

極少可能引發下列嚴重症狀。此時請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

便秘、腹瀉、口乾

4. 若服用兩週左右後症狀仍未改善，請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

- 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處，並蓋緊容器然後保管。
- 請保管於兒童拿不到的地方。
- 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）
 - 換裝於錠劑盒等容器，可能會影響產品及容器的品質。
- 濕氣可能會改變錠劑的外觀，請勿以沾濕的手碰觸。
- 容器內的填充物是為防止錠劑於運送途中破損。開封後請將此填充物取出丟棄。
- 請勿使用已超過使用期限的產品。
- 即使在使用期限內，一旦打開容器瓶蓋後，請在大約6個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內填寫開封日期。



包裝及價格

包裝	建議零售價
18錠	含稅:1,045日圓 (不含稅:950日圓)
36錠	含稅:1,980日圓 (不含稅:1,800日圓)
72錠	含稅:2,970日圓 (不含稅:2,700日圓)