

セルベール整胃錠

第二類醫藥品



セルベール® 整胃錠

Selbelle tablets



用於腹脹、胸口灼熱，透過黏液屏障去調整虛弱胃部的胃藥

セルベール含有增加胃黏液的成分「替普瑞酮」及「天然藥材」，恢復虛弱胃部的健康。

推薦給平時感到胃部虛弱的人。

- 反覆出現「腹脹」、「胸口灼熱」等胃部不適症狀的人
- 稍微勞累或稍微令胃部帶來負擔就會感到不適的人
- 曾因服用止痛藥、感冒藥引致胃部不適的人

セルベール整胃錠，能夠增加「胃黏液」分泌，保護胃黏膜免受胃酸等刺激，還能提高胃的活性去調節虛弱的胃部。

セルベール整胃錠容易服用，1次1錠就有效果。

守護胃部，恢復胃部健康的『整胃®』功效，讓胃部變得輕鬆。

療效或效果



食欲不振

腹脹

進食過量・
飲酒過量

胸口灼熱

腹脹、胸口灼熱、進食過量、飲酒過量、胃部及腹部膨脹感、食欲不振、噁心（想吐、作嘔、噁心）、嘔吐、胸悶

用法及用量

請於餐後將下列的量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
成人（15歲以上）	1錠	1天3次
兒童（未滿15歲）	請勿服用	-

成分


成分及主要作用

成人1天的量3錠中含有下列成分。

成分	含量	働き
替普瑞酮	112.5 mg	增加胃黏液，保護胃部免受胃酸或酒精的刺激。
乾燥蒼朮萃取物 （蒼朮原料）	150 mg （1.5 g）	激活減弱了的胃部運動。
乾燥厚朴萃取物 （厚朴原料）	83.4 mg （1.0 g）	激活減弱了的胃部運動。

添加劑

維生素E、部分預膠化澱粉、赤蘚糖醇、矽酸鈣、硬脂酰富馬酸鈉



注意事項

▲ 使用上的注意事項

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 接受過下列診斷的人
肝臟病

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹、發紅、發癢
消化器官	腹部膨脹感、噁心、腹痛
精神神經系統	頭痛
其他	皮下出血

極少可能引發下列嚴重症狀。此時請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
肝功能障礙	出現發燒、發癢、發疹、黃疸（皮膚和眼白變黃）、褐色尿、全身倦怠、食欲不振等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

便秘、腹瀉、口乾

4. 若服用兩週左右後症狀仍未改善請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。（可能導致誤用或變質。）

- 換裝於錠劑盒等容器，可能會影響產品及容器的品質。

4. 濕氣可能會改變錠劑的外觀，請勿以沾濕的手碰觸。

5. 請勿使用已超過使用期限的產品。

6. 21錠裝、45錠裝的產品，請注意下列事項。

1. 請勿在本容器內放入其他藥劑。
2. 容器內的填充物是為防止錠劑於運送途中破損。開封後請將此填充物取出丟棄。請蓋緊容器然後保管。
3. 即使在使用期限內，一旦打開容器瓶蓋後，請在大約6個月內使用完畢，以確保品質。請於外盒內蓋的「開封年月日」欄內填寫開封日期。



包裝及價格

包裝	建議零售價
12錠	含稅:693日圓 (不含稅:630日圓)
21錠	含稅:1,045日圓 (不含稅:950日圓)
45錠	含稅:2,178日圓 (不含稅:630日圓)