

セルベール整胃錠

第二类药品



セルベール® 整胃錠

Selbelle tablets

セルフメディケーション
税控除対象

用于胃胀、胃热烧心，通过胃粘液屏障来调整胃部虚弱的胃药

セルベール通过能够增加胃粘液的成分“替普瑞酮”和“生药”来保护虚弱的胃，使其恢复活力。

建议平时感觉胃部虚弱的人服用。

- 反复出现【胃胀】【胃热烧心】等胃部不适的人
- 有些劳累或是稍微加重了胃负担就感觉不舒服的人
- 因止疼药、感冒药引起胃部不适的人

セルベール整胃錠通过增加【胃粘液】来保护胃粘膜不受胃酸等的刺激，并通过激活胃的运动来调整胃部虚弱的状态。

セルベール整胃錠是1次1片就有效，易于服用的片剂。

保护并帮助胃恢复活力的【整胃®】作用使胃部感觉更轻松。

效能或效果



食欲不振



胃胀



进食过量・
饮酒过量



胃热烧心

胃胀、胃热烧心、进食过量、饮酒过量、胃部/腹部胀满感、食欲不振、恶心（想吐、作呕、恶心）、呕吐、胸闷

用法及用量

请在饭后用水或温水服用下述量。

年龄	1次剂量	服用次数
成人（15岁以上）	1片	1天3次
儿童（未满15岁）	请勿服用	-

成分

成分及作用

成人1天的量3片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
替普瑞酮	112.5毫克	增加胃粘液，保护胃不受酒精、胃酸等刺激。
苍术干燥提取物 (原生药即苍术)	150毫克 (1.5克)	激活减弱的胃运动。
厚朴干燥提取物 (原生药即厚朴)	83.4毫克 (1.0克)	激活减弱的胃运动。

添加剂

维生素E、部分预糊化的淀粉、赤藓糖醇、硅酸钙、硬脂富马酸钠



注意事项

▲ 使用注意事项

咨询事项

1. 以下的人在服用前请咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

1. 正在接受医师治疗的人
2. 孕妇或疑似怀孕的人
3. 老年人
4. 因药物等出现过过敏症状的人
5. 接受过以下诊断的人

 肝脏病

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹、发红、发痒
消化系统	腹部胀满感、恶心、腹痛
精神神经系统	头痛
其他	皮下出血

偶尔会出现下述重症。此时请立即就医。

症状名称	症状
肝功能障碍	出现发烧、发痒、皮疹、黄疸（皮肤或眼白发黄）、褐色尿、全身无力、食欲不振等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

便秘、腹泻、口腔干燥

4. 若服用两周左右后症状仍无好转则应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射的干燥阴凉处。

2. 请保管在儿童无法触及的地方。

3. 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）

- 如将药片换装到药盒等容器，可能会影响产品和容器的质量。

4. 药片的外观可能会因受潮发生变化，请勿用湿手触摸。

5. 请勿使用超过使用期限的产品。

6. 21片包装和45片包装，请注意以下事项。

1. 请不要在本容器内放其他药物等。

2. 容器内的填充物用于防止运输中的片剂破损。开封后请扔掉填充物。请将容器密封保存。

3. 从质量保证的角度出发，即使在使用期限内，一旦开封后请以在6个月内使用为准。请在包装盒内盖的“开封年月日”一栏填写开封日期。



包装及价格

包装	建议零售价
12片	含税:693日元（不含税:630日元）
21片	含税:1,045日元（不含税:950日元）
45片	含税:2,178日元（不含税:1,980日元）