

トラベルミンR

第二類醫藥品



トラベルミン®R

預防及舒緩暈車

トラベルミンR是有效預防及舒緩暈車症狀的暈車藥。

トラベルミンR使用了令人睡意較少的成分，即使在暈車後才服用亦有效。

讓您坐巴士、火車期間亦能享受旅程。

トラベルミンR從11歲以上的兒童到成人均可服用。

療效或效果



暈車藥

預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛

用法及用量

要預防暈車，請於搭車或搭船前30分鐘，將下列的1次量用水或溫水服用。

年齡	1次用量	服用次數
15歲以上	1錠	相隔4小時以上，最多2次
11歲~14歲	1錠	相隔4小時以上，最多2次
未滿11歲	請勿服用	-

此外，若要追加服用，請相隔4小時以上服用1次量。1天最多服用2次。

用法及用量相關的注意事項

要給兒童（11歲~14歲）服用時，請在家長的指導監督下服用。在學校旅行等讓其攜帶的情況下，請於事前詳細指導用法、用量等的服用方法。

取出錠劑的方法

請如下圖，用指尖用力按壓放有錠劑的包裝膜凸出部位，將背面的鋁箔弄破，然後取出錠劑服用。（如果誤將包裝膜一起吞服，有可能會引致刺穿食道黏膜等的意外事故。）



成分

成分與主要作用

1次量（11歲以上）1錠中含下列成分。

成分	含量	主要作用
鹽酸待芬尼朵	16.6 mg	抑制自律神經系統異常興奮的情況
氫溴酸東莨菪鹼水合物	0.16 mg	減輕因乘坐交通工具而引起的知覺混亂
無水咖啡因	30.0 mg	預防因乘坐交通工具而引起的知覺混亂
鹽酸吡哆醇（維生素B ₆ ）	5.0 mg	對噁心及頭暈有效

添加劑

滑石粉、玉米澱粉、乳糖、羥丙基纖維素、二氧化鈦、氧化鐵、硬脂酸鎂、纖維素、羥丙基甲基纖維素、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙二醇



注意事項

▲ 使用上的注意事項



禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

2. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。

（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）



諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正在接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 年長者
4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
5. 有下列症狀的人

排尿困難

6. 接受過下列診斷的人

青光眼、心臟病

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
精神神經系統	頭痛、浮動感、不穩定感
循環器官	心悸
泌尿器官	排尿困難
其他	臉發燙、異常目眩

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重，請停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、嗜睡、視力模糊

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。



包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅：1,100日圓（不含稅：1,000日圓）