

トラベルミン (大人用)

第二類醫藥品



トラベルミン®

預防及舒緩暈車

トラベルミン是有效預防及舒緩暈車症狀，適合大人服用的暈車藥。
若擔心會暈車，在乘車前30分鐘服用，就能預防暈車症狀。
即使在暈車的時候服用亦能改善「頭暈」、「噁心」、「頭痛」等的暈車症狀，讓你能夠享受旅程。

療效或效果



暈車藥

預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛

用法及用量

要預防暈車，請於搭車或搭船前30分鐘，將下列的1次量嚼碎或者溶於口中服用。


年齡	1次用量	服用次數
----	------	------

15歲以上	1錠	相隔4小時以上，最多3次
未滿15歲	請勿服用	-

此外，若要追加服用，請相隔4小時以上服用1次量。1天最多服用3次。

取出錠劑的方法

請如下圖，用指尖用力按壓放有錠劑的包裝膜凸出部位，將背面的鋁箔弄破，然後取出錠劑服用。
(如果誤將包裝膜一起吞服，有可能會引致刺穿食道黏膜等的意外事故。)



成分

成分與主要作用

1錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
水楊酸苯海拉明	40mg	作用於自律神經系統，預防及舒緩暈車症狀。
二氫丙茶鹼	26mg	抑制因搖晃而引起的知覺混亂，預防暈車。

添加劑

滑石粉、玉米澱粉、乳糖、羧甲基纖維素鈣、氫化油、二氧化鈦、硬脂酸鈣、纖維素、羥丙基甲基纖維素、聚乙烯二醇、無水矽酸

注意事項

▲ 使用上的注意事項

禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

1. 下列的人請勿服用。

接受過下列診斷的人
青光眼、前列腺肥大

2. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他量車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

3. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。

（可能出現嗜睡等。）

4. 正在哺乳的人請勿服用本藥劑，或者服用本藥劑時，請避免哺乳。

5. 請勿過量服用。

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

1. 正在接受醫師治療的人
2. 孕婦或可能懷孕的人
3. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
4. 有下列症狀的人
排尿困難
5. 接受過下列診斷的人
癲癇、甲狀腺功能障礙

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
循環器官	心悸
泌尿器官	排尿困難

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重，請停止服用，攜帶此說明書，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、嗜睡

其他注意事項

請注意在服用本藥劑期間，如飲用酒精類飲品，有可能會加強藥物的作用。

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。而且，請勿在本容器內放入其他藥劑等。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。



包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅:660日圓 (不含稅:600日圓)