

トラベルミン (大人用)

第二类医薬品



トラベルミン®

预防和缓解晕车症状

トラベルミン是可以预防和缓解晕车症状的成人款晕车药。
如果担心晕车，在乘坐前30分钟服用就可以预防晕车症状。
即使在晕车时，也可以通过服用本药剂来改善“头晕”“恶心”“头痛”等晕车症状，继续享受旅行乐趣。

效能或效果



晕车

预防和缓解因晕车引起的头晕、恶心、头痛

用法及用量

为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，咀嚼或放入口中溶解服用以下1次的量。


年齢	1次剂量	服用次数
----	------	------

15岁以上	1片	间隔4小时以上，最多服用3次
未满15岁	请勿服用	-

同时，如需追加服用，需间隔4小时以上服用1次的量。1天的服用次数不可超过3次。

如何取出药片

如下图所示，用指尖用力按压装有药片的泡罩包装的凸起部分，挤破背面的铝箔，取出药片并将其服用。（如果不慎将泡罩包装也一起吞入的话，会导致食道粘膜被刺伤等意外事故。）



成分

成分和作用

1片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
苯海拉明水杨酸盐	40毫克	作用于植物神经系统，预防、缓解晕车症状。
二羟丙茶碱	26毫克	抑制因摇晃引起的感觉混乱，预防晕车。

添加剂

滑石粉、玉米淀粉、乳糖、羧甲基纤维素钙、氢化油、氧化钛、硬脂酸钙、纤维素、羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、二氧化硅

注意事项

▲ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用及事故

1. 以下的人请勿服用。

接受过以下诊断的人
青光眼、前列腺肥大

2. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。

其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、含抗组胺剂的內服药等（鼻炎用內服药、抗过敏药等）

3. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。

（有可能会出現嗜睡症状。）

4. 处于哺乳时期时请不要服用本药剂，或在服用本药剂时请不要进行哺乳。

5. 请勿过量服用。

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 正在接受医师治疗的人
- 孕妇或疑似怀孕的人
- 因药物等出现过过敏症状的人
- 有以下症状的人
排尿困难
- 接受过以下诊断的人
癫痫、甲状腺功能障碍

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、嗜睡

其他注意事项

请注意如果在服用本药期间饮酒，则可能会有较强的药效出现。

保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。

包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:660日元（不含税:600日元）