

トラベルミン チュロップ ぶどう味（品 牌：トラベ ルミン チュロップぶどう 味）

第二類醫藥品



トラベルミン® チュロップ ぶどう味

預防及舒緩暈車

品 牌：トラベルミン チュロップぶどう味

トラベルミン チュロップぶどう味，有效緩和及預防因暈車而引起的頭暈、噁心等症狀，能令您在旅行及出門時舒適愉快。

這是兒童容易服用的口含型暈車藥，在出發前匆忙或感到不舒服後，亦可立刻服用。

療效或效果



暈車藥

預防及舒緩因暈車而引起的頭暈、噁心及頭痛

用法及用量

要預防暈車，請於搭車或搭船前30分鐘，將下列1次量嚼碎或者溶於口中服用。

年齡	1次用量	服用次數
15歲以上	2錠	相隔4小時以上，最多2次
11歲~14歲	2錠	相隔4小時以上，最多2次
5歲~10歲	1錠	相隔4小時以上，最多2次
未滿5歲	請勿服用	-

此外，若要追加服用，請相隔4小時以上服用1次量。1天的服用次數為最多服用2次。

用法及用量相關的注意事項

要給兒童（5歲~14歲）服用時，請在家長的指導監督下服用。在學校旅行等讓其攜帶的情況下，請於事前詳細指導用法、用量等的服用方法。

請注意

- 本藥劑是可嚼碎，或者溶於口中服用的藥劑。若難於嚼碎時，為免弄傷牙齒，請溶於口中才服用。請多加注意，以免藥劑卡在喉嚨。
- 服用時，一次只能放入1錠於口中，請勿同時放入2錠。



成分

成分及主要作用

1次量（11歲以上）2錠中含有下列成分。

成分	含量	主要作用
----	----	------

d-氯苯那敏馬來酸鹽	1.33mg	作用於自律神經系統，緩和及預防暈車症狀。
氫溴酸東莨菪鹼水合物	0.166mg	減輕因乘坐交通工具而引起的知覺混亂。

添加劑

乙醇、檸檬酸、丙二醇、l-薄荷醇、香料、安賽蜜、異麥芽酮糖醇、脂肪酸甘油酯、銅葉綠素鈉



注意事項

⚠ 使用上的注意事項

禁止事項

若不遵守，現在的症狀會惡化，或者容易引發副作用、意外

1. 服用本藥劑的期間，請勿服用下列任何一種醫藥品。

其他暈車藥、感冒藥、解熱鎮痛藥、鎮靜藥、鎮咳祛痰藥、胃腸鎮痛鎮痙藥、含有抗組織胺劑的內服藥等（鼻炎用內服藥、過敏用藥等）

2. 服用後，請勿駕駛操作交通工具或機械類。（可能出現嗜睡、視力模糊和異常目眩等症狀。）

諮詢事項

1. 下列的人於服用前，請諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

- 1. 正在接受醫師治療的人
- 2. 孕婦或可能懷孕的人
- 3. 年長者
- 4. 曾因藥品等，引發過敏症狀的人
- 5. 有排尿困難的人
- 6. 接受過青光眼、心臟病診斷的人

2. 服用後，若出現下列症狀，有可能是副作用，請立刻停止服用，並攜帶此包裝盒，諮詢醫師、藥劑師或登錄販賣者。

相關部位	症狀
皮膚	發疹/發紅、發癢
精神神經系統	頭痛
泌尿器官	排尿困難
其他	臉發燙、異常目眩

極少可能引發下列嚴重症狀。此時請立刻接受醫師的診療。

症狀名稱	症狀
再生不良性貧血	出現瘀青、流鼻血、牙齦出血、發燒、皮膚和黏膜看起來蒼白、疲勞感、心悸、氣短、身體不適，暈眩、血尿等。
無顆粒性白血球症	出現突然發高燒、發冷、喉嚨痛等。

3. 服用後，可能出現下列症狀，如果這種症狀持續或變嚴重，請停止服用，並攜帶此包裝盒，詢諮醫師、藥劑師或登錄販賣者。

口乾、便秘、嗜睡、視力模糊

保管及使用上的注意事項

1. 請保管於陽光直射不到、濕氣少的陰涼處。
2. 請保管於兒童拿不到的地方。
3. 請勿換裝於其他容器。（可能導致誤用或變質。）
4. 請勿使用已超過使用期限的產品。



包裝及價格

包裝	建議零售價
6錠	含稅:521日圓（不含稅:474日圓）