

# トラベルミン チュロップ ぶどう味（品牌：トラベ ルミン チュロップぶどう 味）



第二类药品

## トラベルミン<sup>®</sup> チュロップ。ぶどう味

预防和缓解晕车症状

品牌：トラベルミン チュロップぶどう味

トラベルミン チュロップぶどう味能够预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心等症状，让旅行和出行变得轻松愉快。

便于儿童服用的糖丸型制剂，即使在出发前匆忙时或感到不舒服时，也可以马上服用。



## 效能或效果



晕车

预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心/头痛

# 用法及用量

为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，咀嚼或放入口中溶解服用以下1次的量。

年龄	1次剂量	服用次数
15岁以上	2片	间隔4小时以上，最多服用2次
11岁～14岁	2片	间隔4小时以上，最多服用2次
5岁～10岁	1片	间隔4小时以上，最多服用2次
未满5岁	请勿服用	-

同时，如果需要追加服用，需间隔4小时以上服用1次的量。1天的服用次数不可超过2次。

## 用法及用量相关注意事项

儿童（5岁～14岁）请在监护人指导监督下服用。如果孩子需要在学校修学旅行等时服用，请事先向孩子说明用法、用量等服用方法。

## 注意

- 本品是咀嚼或在口中溶解后服用的药剂。难以咀嚼时，请将药剂溶解之后再服用以免损伤牙齿。服用时请充分注意，避免药剂堵住咽喉。
- 请1次服用1片，请勿将2片药同时放入口中。

## 成分

## 成分和作用

1次的量（11岁以上）2片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用

d-氯苯那敏马来酸酯	1.33毫克	作用于植物神经系统，预防、缓解晕车症状。
东莨菪碱氢溴酸盐水合物	0.166毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱。

## 添加剂

乙醇、柠檬酸、丙二醇、l-薄荷醇、香料、乙酰磺胺酸钾、异麦芽酮糖醇、甘油脂肪酸酯、叶绿素铜钠



## 注意事项

### ▲ 使用注意事项

#### 禁止事项

若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用及事故

##### 1. 在服用本药剂期间，请勿服用下述任何医药品。

其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、胃肠镇痛镇痉药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）

##### 2. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。（有可能会出现嗜睡、视线模糊或异常眩光等症状。）

#### 咨询事项

##### 1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

1. 正在接受医师治疗的人
2. 孕妇或疑似怀孕的人
3. 老年人
4. 因药物等出现过过敏症状的人
5. 排尿困难的人
6. 接受过青光眼、心脏病诊断的人

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本药盒咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
精神神经系统	头痛
泌尿系统	排尿困难
其他	脸部灼热、异常眩光

偶尔出现下述严重症状。此时请立即就医。

症状名称	症状
再生障碍性贫血	出现淤青、鼻血、牙龈出血、发烧、皮肤或粘膜发白、疲劳感、心悸、气短、身体不适难以站稳、血尿等症状。
粒细胞缺乏症	出现突发高烧、发冷、咽喉疼痛等症状。

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本药盒咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、嗜睡、视线模糊

## 保管及使用注意事项

1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉处。
2. 请保管在儿童无法触及的地方。
3. 请不要移至其他容器中。（会导致误用或变质。）
4. 请勿使用超过使用期限的产品。



## 包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:521日元 (不含税:474日元)