

トラベルミンR

第二类医药品



预防和缓解晕车症状

トラベルミンR是能够有效预防和缓解晕车症状的晕车药。

トラベルミンR不易引起困意，并含有在晕车后才服用亦可起效的成分。

可以让您在乘坐巴士或电车时享受旅行乐趣。

トラベルミンR从11岁以上儿童到成人均可服用。

效能或效果



晕车

预防和缓解因晕车引起的头晕/恶心/头痛



用法及用量

为预防晕车，请在乘坐车船前30分钟，用水或温水服用以下1次的量。

年龄	1次剂量	服用次数
15岁以上	1片	间隔4小时以上，最多服用2次
11岁～14岁	1片	间隔4小时以上，最多服用2次
未满11岁	请勿服用	-


同时，如需要追加服用，需间隔4小时以上服用1次的量。1天的服用次数不可超过2次。

用法及用量相关注意事项

儿童（11岁～14岁）请在监护人指导监督下服用。如果孩子需要在学校修学旅行等时服用，请事先向孩子说明用法、用量等服用方法。

如何取出药片

如下图所示，用指尖用力按压装有药片的泡罩包装的凸起部分，挤破背面的铝箔，取出药片并将其服用。（如果不慎将泡罩包装也一起吞入的话，会导致食道粘膜被刺伤等意外事故。）



成分

成分和作用

1次的量（11岁以上）1片中含有下述成分。

成分	含量	药理作用
盐酸地芬尼多	16.6毫克	抑制植物神经系统的异常兴奋
东莨菪碱氢溴酸盐水合物	0.16毫克	减轻因乘坐交通工具而产生的感觉混乱
无水咖啡因	30.0毫克	预防因乘坐交通工具而产生的感觉混乱
盐酸吡哆醇（维生素B ₆ ）	5.0毫克	对恶心头晕有效

添加剂

滑石粉、玉米淀粉、乳糖、羟丙基纤维素、氧化钛、氧化铁、硬脂酸镁、纤维素、羟丙甲纤维素、聚维酮、聚乙二醇



注意事项

⚠ 使用注意事项

禁止事项

若不遵守则会导致当前症状恶化，或容易出现副作用及事故

1. 在服用本药剂期间，请不要服用下述任何医药品。
其他晕车药、感冒药、解热镇痛药、镇静药、镇咳祛痰药、胃肠镇痛镇痉药、含抗组胺剂的内服药等（鼻炎用内服药、抗过敏药等）
2. 服用后请不要驾驶交通工具或操作机械类。

(有可能会出现嗜睡、视线模糊或异常眩光等症状。)

咨询事项

1. 以下的人在服用前应咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

- 1. 正在接受医师治疗的人
- 2. 孕妇或疑似怀孕的人
- 3. 老年人
- 4. 因药物等出现过过敏症状的人
- 5. 有以下症状的人

排尿困难

- 6. 接受过以下诊断的人

青光眼、心脏病

2. 服用后若出现下述症状，则可能是副作用，此时应立即停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

相关部位	症状
皮肤	皮疹/发红、发痒
精神神经系统	头痛、漂浮感、不稳定感
循环系统	心悸
泌尿系统	排尿困难
其他	脸部灼热、异常眩光

3. 服用后可能出现下述症状，若症状持续或加重时应停止服用，并携带本说明书咨询医师、药剂师或登录贩卖者。

口腔干燥、便秘、嗜睡、视线模糊

保管及使用注意事项

- 1. 请保管在避免阳光直射，干燥阴凉处。
- 2. 请保管在儿童无法触及的地方。
- 3. 请不要移至其他容器中。此外，请不要将其他药剂等放入本容器中。（会导致误用或变质。）

4. 请勿使用超过使用期限的产品。



包装及价格

包装	建议零售价
6片	含税:1,100日元（不含税：1,000日元）