

トラベルミン (大人用)

제2류의약품



トラベルミン®

멀미 예방과 완화에

TRAVELMIN은 멀미 증상의 예방 및 완화에 유효한 성인용 멀미약입니다.

멀미 걱정이 있을 경우, 탑승 30분 전에 복용함으로써 멀미 증상을 예방할 수 있습니다.

또한, 이미 멀미가 시작된 경우라도 복용으로 멀미 증상인 '어지러움'과 '메스꺼움', '두통'을 개선하여 여행을 즐길 수 있습니다.

효능 · 효과



멀미

멀미로 인한 어지러움 · 메스꺼움 · 두통의 예방 및 완화

용법 · 용량


멀미 예방 목적으로는 승차 또는 승선 30분 전에 다음 1회량을 씹거나 입안에서 녹여 복용하십시오.

연령	1회량	복용횟수
15세 이상	1정	4시간 이상 간격을 두고 3회까지
15세 미만	복용하지 말 것	-

또한, 추가 복용할 경우에는 1회량을 4시간 이상 간격을 두고 복용하십시오. 1일 복용 횟수는 3회까지입니다.

정제 꺼내는 법

정제가 들어 있는 PTP 시트의 볼록한 부분을 손가락 끝으로 강하게 눌러 뒷면의 알루미늄 포일을 뚫은 후, 정제를 꺼내어 복용하십시오.(잘못하여 시트를 그대로 삼키면 식도 점막에 끼히는 등 불의의 사고로 이어질 수 있습니다.)



성분

성분과 작용

1정 중에 다음의 성분이 포함되어 있습니다.

성분	함량	역할
디펜히드라민살리실산염	40mg	자율신경에 작용하여, 멀미 증상을 예방·완화합니다.
디프로필린	26mg	흔들림에 의해 발생하는 감각의 혼란을 억제하고, 멀미를 예방합니다.

첨가물

텔크, 옥수수전분, 유당, 카르멜로오스칼슘, 경화유, 산화티탄, 스테아린산칼슘, 셀룰로오스, 히프로멜로오스, 마크로골, 무수규산



주의사항

⚠ 사용상의 주의

해서는 안 되는 사항

지키지 않으면 현재 증상이 악화되거나 부작용 및 사고가 발생하기 쉽습니다.

1. 다음에 해당하는 사람은 복용하지 마십시오.

다음의 진단을 받은 사람
녹내장, 전립선 비대증

2. 본 제품을 복용하는 동안은 다음 중 어느 의약품도 복용하지 마십시오.

다른 멀미약, 감기약, 해열진통제, 진정제, 진해거담제, 항히스타민제를 함유한 내복약 등(비염 내복약, 알레르기약 등)

3. 복용 후, 운전 또는 기계 조작을 하지 마십시오.

(졸음 등의 증상이 나타날 수 있습니다.)

4. 수유중인 사람은 본제를 복용하지 않거나 본제를 복용할 경우에는 수유를 피하십시오.

상담할 사항

1. 다음에 해당하는 사람은 복용 전에 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

1. 의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 임산부 또는 임신중이라고 생각되는 사람
3. 약 등으로 인해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
4. 다음의 증상이 있는 사람
배뇨곤란

5. 다음의 진단을 받은 사람
간질, 갑상선기능장애

2. 복용 후, 다음과 같은 증상이 나타난 경우에는 부작용의 가능성이 있으므로, 즉시 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

관계부위	증상
피부	발진・발적, 가려움
순환기	두근거림
비뇨기	배뇨곤란

3. 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 지속되거나 심해지는 경우에는 복용을 중지하고, 이 설명서를 가지고 의사, 약사 또는 등록판매자와 상담하십시오.

입마름, 졸음

기타 주의

본 제품을 복용하는 동안, 알코올류를 음용하면 약의 작용이 강하게 나타날 수 있으므로 주의하십시오.

보관 및 취급상의 주의

- 1. 직사광선이 닿지 않고 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 2. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3. 다른 용기에 옮겨 담지 마십시오. 또한, 본 용기안에 다른 약제 등을 넣지 마십시오.(오용의 원인이 되거나 변질될 수 있습니다.)
- 4. 사용기한이 지난 제품은 사용하지 마십시오.



포장 및 가격

포장	권장소비자가격
6정	세금 포함:660엔 (세금 별도:600엔)